

Motivi più frequenti di sospensione temporanea dalle donazioni

Il donatore, al momento della donazione, non deve in alcun modo mettere a rischio la salute del ricevente né la propria. Prima di effettuare la donazione deve controllare di non avere malattie o situazioni di rischio estemporanee e, se queste sono recenti, che sia trascorso il periodo di quarantena (vedi sotto). Inoltre deve comunicare tempestivamente qualunque malattia occorsa il giorno della donazione o nelle 24 ore successive. Il periodo di sospensione va calcolato a partire dal giorno di risoluzione dell'indisposizione, dell'ultima assunzione di farmaci, del termine delle varie cure, dell'intervento chirurgico, del rientro dall'ultimo viaggio effettuato all'estero, ecc.

Categoria	Descrizione	Periodo di sospensione
a <u>malattie infettive</u>	Influenza, bronchite, faringite, ecc	15 giorni
	Raffreddore	7 giorni
b <u>farmaci</u>	Aspirina, antinfiammatori, analgesici, antipiretici	5 giorni
	Antibiotici e cortisonici	15 giorni
	Isotretinoina (acne)	2 mesi
	Etretinato (psoriasi)	esclusione
	Psicofarmaci	3 mesi
	Tutti gli altri farmaci	24 ore
c <u>vaccini</u>	Febbre gialla, rosolia, TBC, parotite, morbillo	1 mese
	Epatite A e B, antitetanica, antitifida, antinfluenzale, antirabbica (senza morso)	2 giorni
	Sieroprofilassi: antitetanica	3 giorni
	antiepatite (in seguito esposizione a rischi di epatite)	1 anno
d <u>allergie stagionali</u>	Periodo di riacutizzazione	15 giorni
e <u>cure dentarie</u>	Non cruenta (otturazione, pulizia, ecc)	2 giorni
	Cruente (estrazioni, devitalizzazioni, interventi sulle gengive, ecc)	7 giorni
	Implantologia	4 mesi
f <u>interventi chirurgici</u>	Maggiori (degenza superiore a 3 giorni)	4 mesi
	Minori (degenza inferiore o uguale a 3 giorni)	1 mese
	In Day Hospital o ambulatorio ospedaliero	7 giorni
g <u>esami endoscopici</u>	Gastroscopia, colonoscopia, artroscopia, ecc	4 mesi
h <u>altre pratiche</u>	Tatuaggi, piercing, foratura delle orecchie, agopuntura (senza aghi monouso)	4 mesi
i <u>viaggi all'estero</u>	In Europa o nell'America del Nord	nessuno
	In Paesi tropicali	6 mesi
	In Paesi tropicali con febbre nei 6 mesi dal rientro	fino a 3 anni
	In altri stati	da valutare

Ed inoltre per le donatrici

l <u>Periodo Mestruale</u>	per tutta la durata
m <u>Gravidanza</u>	per tutta la durata
n <u>Parto</u>	1 anno
o <u>Aborto</u>	6 mesi
p <u>Pillola Anticoncezionale</u>	nessuno